



## Pr **Monoferric**<sup>®</sup> 患者指南

Monoferric用于治疗成人缺铁性贫血。当体内缺少足够的铁时，便会出现这种状况。Monoferric适用于对口服铁剂不耐受或口服铁剂治疗效果不佳的情况。

 **Pr** **Monoferric**<sup>®</sup>  
*ferric derisomaltose*

请访问[www.MonoFerric.ca](http://www.MonoFerric.ca)，查找其他有用的 MonoFerric资源，如输液诊所定位器和 **6 种语言**的可打印病人手册：

- 英语
- 中文（简体）
- 法语
- 中文（繁体）
- 西班牙语
- 旁遮普语

**使用该号码进入网站：02477777**

# 目录

- 4 什么是缺铁性贫血（IDA）？
- 5 造成缺铁性贫血的原因有哪些？
- 6 缺铁性贫血的体征和症状
- 7 Monoferric是什么，它的工作原理是什么？
- 8 在使用Monoferric之前，医生应该了解我的哪些情况？
- 10 在使用Monoferric治疗期间会发生什么？
- 11 在使用Monoferric治疗之后会发生什么？
- 12 使用Monoferric可能出现的副作用
- 14 如果出现哪些严重副作用，我应该向医护人员报告？
- 14 我可以在哪里了解有关Monoferric的更多信息？


本手册可帮助您了解有关Monoferric治疗的更多信息，以及如何识别和管理可能出现的副作用。

# 什么是缺铁性贫血 (IDA) ?

缺铁性贫血是由于体内缺乏铁元素而引起的疾病。

铁对人体内包括血红蛋白产生在内的各项功能有着重要作用，血红蛋白是红细胞中的分子，负责将氧气携带到身体的各个部分。

如果体内的铁含量不足，身体所产生的红细胞就会越来越少，血红蛋白也会随之减少，从而无法向身体组织输送足够的氧气。



# 造成缺铁性贫血的原因有哪些？

造成缺铁性贫血的原因有很多，包括：

- 失血
- 铁吸收不良
- 与炎症相关的多种机制
- 饮食中的铁含量不足
- 铁需求增加

Monoferic适用于对口服补铁药物（口服）不耐受或无反应的患者。



# 缺铁性贫血的体征和症状


## 缺铁性贫血的体征包括：

- 皮肤苍白或发黄
- 指甲变脆
- 脱发
- 腿部感觉不适或不舒服，难以克制想要活动双腿的冲动（不安腿综合征）
- 舌头疼痛或舌苔光滑
- 嘴角开裂



## 缺铁性贫血的症状可能包括：

- 原因不明的疲劳或精力不足
- 呼吸急促或胸痛，尤其是活动时
- 原因不明的全身无力
- 心跳加速
- 耳内有心跳声或风声
- 头痛，尤其是活动时
- 手脚发冷
- 难以集中精力
- 晕眩
- 异常渴望冰或粘土等非食物物品（医学术语：异食癖）




请注意，您可能会没有任何明显的缺铁性贫血的体征和症状。医生在开具 Monoferric 的处方之前会验血以确定您是否需要补铁，并进行测量体重等其他检查，以确定您需要多大剂量的 Monoferric。

# Monoferric是什么，它的工作原理是什么？

Monoferric是一种暗褐色的不透明无菌溶液，含有结合铁分子，可用于对口服补铁药物不耐受或无反应的成年患者补铁。

Monoferric用于向您的身体输送铁，并补充身体的铁储备。Monoferric被输送到人体后，铁在体内被肝脏和脾脏中的细胞吸收并缓慢释放。铁是制造血红蛋白所必需的元素，而血红蛋白是红细胞能够在体内携带氧气所必不可少的。



# 在使用Monoferric之前，医生应该了解我的哪些情况？

如果您有以下状况，请在使用Monoferric之前先咨询医生：

- 有药物过敏史
- 患有红斑狼疮（人体自身的防御系统攻击正常组织的一种免疫系统疾病）
- 患有类风湿关节炎（关节肿胀）
- 患有严重的哮喘、湿疹（皮肤瘙痒、发红），或其他过敏症状
- 患有低血压
- 有严重感染
- 年龄超过65岁
- 正在服用其他药物，包括任何药品、维生素、矿物质、天然补品或替代药物(Monoferric会降低口服铁补充剂的作用)



与医生讨论您可能有的任何健康状况或问题，包括上面列出的状况，将有助于避免副作用并确保正确使用Monoferric。





### 如果您有以下状况，请不要使用MonoFerric：

- 对此药物或其中任何成分过敏
- 对其他铁注射剂有严重过敏史
- 患有**并非**因缺铁引起的贫血症（溶血性贫血）
- 体内铁含量过高（铁过载），或身体的铁消耗异常（血色沉着症、含铁血黄素沉着症）
- 患有肝脏疾病（肝硬化、肝炎）

# 在使用Monoferric治疗期间会发生什么？

每个人的Monoferric常规剂量各有不同。医生会根据您的体重、血液中的血红蛋白含量和您需要的铁量来计算确切的剂量。体重超过50kg的患者可能会接受固定的Monoferric剂量，为1000mg。

给药可能仅一次或每周一次，直至病情得到治疗。Monoferric的给药方式包括：

- 通过手臂的静脉。这种方式也被称为静脉输注或静脉注射
  - 静脉输注将至少需要20-30分钟
  - 静脉注射将在2分钟内完成
- 在血液透析过程中直接注入透析器

Monoferric治疗结束后4周内，医疗人员将评估您的情况，查看是否需要更多的治疗。

在治疗期间，医生或护士会仔细观察您可能出现的副作用。

注射型铁剂产品可能会引起严重的过敏反应，包括致命的过敏反应或类过敏反应。Monoferric可能导致严重的低血压（血压偏低）。

使用Monoferric时，医护人员会在能够及时治疗过敏事件的地方进行给药。每次使用Monoferric治疗期间以及之后至少30分钟，医护人员会仔细观察您的过敏反应体征和症状，包括监测血压和脉搏。

**如果您在使用Monoferric时出现以下任何过敏反应症状，请立即寻求医疗帮助，并确保您的医生或护士停止Monoferric治疗：**

- 头晕或头晕目眩
- 面部、舌头或喉咙肿胀
- 吞咽困难
- 瘙痒、皮疹或荨麻疹
- 呼吸困难
- 恶心或腹痛
- 低血压

为确保Monoferric使用正确，如果您有任何刺激感或注射部位周围皮肤出现褐色，请务必告知医护人员，因为他们需要停止给药。

不正确的Monoferric给药可能导致注射部位出现泄漏，进而刺激皮肤。此外，该部位和身体其他部位的皮肤颜色可能会变成褐色。这种状况可能是长期性的。如果您发现任何泄漏，请立即告知医护人员。他们将停止给药。



## 在使用Monoferric治疗之后会发生什么？

每次使用Monoferric治疗后，医护人员将对您进行至少30分钟的监测，您的医生会安排验血，以监测您体内的血红蛋白水平和铁储备。

使用Monoferric治疗后，先看看自己是否感觉良好，然后再开车或使用机械。

# 使用Monoferric可能出现副作用

## Monoferric的副作用可能包括：

- 腹痛
- 背痛
- 胸痛
- 便秘
- 腹泻
- 大便变色
- 晕眩
- 疲劳
- 发烧
- 注射后数小时至数天内可能出现类似流感的病症，通常的症状包括发烧、肌肉和关节疼痛等
- 潮红
- 头痛
- 消化不良
- 关节疼痛
- 肌肉疼痛或痉挛
- 恶心
- 呕吐
- 皮肤剥落或变色
- 皮肤瘙痒
- 咽喉痛
- 咳嗽
- 鼻子和喉咙发炎
- 手脚肿胀
- 味觉障碍
- 刺痛感

## 其他您应该知道的警告

- 注射型铁剂产品可能导致严重的副作用，包括：
  - 超敏（过敏）反应，当免疫系统反应过度并对身体造成伤害时，便会出现超敏反应。即使在给予治疗且没有问题之后，也会出现这种反应
  - 感染
- 可能导致血液中磷酸盐含量偏低（低磷血症）
- 服用Monoferric后，先看看自己是否感觉良好，然后再开车或使用机械
- Monoferric不适宜处于妊娠期或未采取适当避孕措施的育龄女性。若您已经怀孕或正在备孕，及时告知您的医生。接受Monoferric治疗时，您可能出现严重的过敏反应，这可能对您未出生的婴儿造成严重伤害。他们可能会出现心率异常缓慢。这通常会持续很短时间。如果您在怀孕期间服用这种药物，专业医护人员应仔细监控胎儿。



**这些并不是使用Monoferric时可能会感觉到的所有副作用。  
如果您出现此处未列出的任何副作用，请与您的医生联系。**

# 如果出现哪些严重副作用，我应该向医护人员报告？

如果出现以下任何一种不常见的严重副作用，请咨询您的医生：

条件	症状
过敏反应（超敏反应）	可能危及生命的晕眩、严重瘙痒、荨麻疹、恶心、呼吸困难、皮疹、低血压
肺炎	肺部感染引起胸痛、咳嗽、发烧和疲劳
尿路感染	小便时有烧灼感，尿液混浊或有血尿，有强烈气味
高血压	头痛、头晕、视力模糊、胸痛或呼吸急促
低血压	昏厥、晕眩，或站立时感到头昏眼花
红细胞数量减少（贫血）	晕眩、感觉疲劳和虚弱、精力不足、呼吸急促

## 我可以在哪里了解有关 Monoferric 的更多信息？

有关 Monoferric 的更多信息：

- 咨询医护人员
- 有关预防措施和不良事件的完整信息，请参阅产品包装中随附的“患者用药信息”传单

如果您有此处未列出的症状/副作用，或者严重到足以干扰您日常活动的症状/副作用，或者您出现以下任何罕见的副作用，请与您的医生联系：

- 充血性心力衰竭（心脏不能正常泵出血液）：呼吸短促、疲劳和虚弱、脚踝和腿脚踝和腿及脚部肿胀、咳嗽、体液潴留、食欲不振、恶心、心跳加快或不规则、体力下降
- 呼吸困难（呼吸短促或困难）
- 心肌梗塞（心脏病发作）：肩胛骨之间、胸部、下颌、左臂或上腹部有压迫感或挤压痛、气短、头晕、疲劳、头晕目眩、皮肤粘稠、出汗、消化不良、焦虑、感觉眩晕，及可能出现不规则心跳
- 皮疹：皮肤发红区域，伴有发痒或疼痛
- 发热（发烧）
- 癫痫发作（痉挛或抽搐）
- 败血症（严重感染）
- 晕厥（昏厥）：由于血压突然下降而暂时失去意识

也可能出现超敏（过敏）反应，这可能会危及生命。症状可能包括发烧、关节痛、恶心、呕吐、胸痛、皮疹、荨麻疹、脸/唇/舌/喉部肿胀和/或吞咽/呼吸困难。如果您出现任何以上症状，请停止服用Monoferic并立即就医。

## 备注：

---

---

---

---

---

---

---

---



有关其他 MonoferriC 信息  
和资源，请访问  
[www.MonoferriC.ca](http://www.MonoferriC.ca)。



使用该号码进入网站：02477777

MonoferriC®是Pharmacosmos Holding A/S, Rørvangsvej 30, DK-4300 Holbæk, Denmark的注册商标，经Pfizer Canada ULC 授权在加拿大使用。

© 2023 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5  
® Pfizer Canada ULC, Licensee

PP-MFR-CAN-0176-EN

