



Pr **Monoferric**[®] 患者服用 指南

Monoferric用於治療成人缺鐵性貧血。當體內缺少足夠的鐵時，便會出現這種狀況。Monoferric適用於對口服鐵劑不耐受或口服鐵劑治療效果不佳的情況。

 **Pr Monoferric**[®]
ferric derisomaltose

請訪問www.MonoFerric.ca, 查找其他有用的
MonoFerric 資源，如輸液診所定位器與
6 種語言的可列印病人手冊：

- 英語
- 中文（簡體）
- 法語
- 中文（繁體）
- 西班牙語
- 旁遮普語

使用該號碼進入網站：02477777

目錄

- 4 甚麼是缺鐵性貧血（IDA）？
- 5 造成IDA的原因是甚麼？
- 6 IDA的體徵和症狀
- 7 甚麼是Monoferric，它如何起作用？
- 8 我使用Monoferric之前，醫生應該了解哪些情況？
- 10 Monoferric治療期間我應該期待什麼？
- 11 Monoferric治療後我應該期待什麼？
- 12 Monoferric的可能副作用
- 14 我應該向醫療保健專業人員報告哪些嚴重副作用？
- 14 我在哪裡可以了解有關Monoferric的更多資訊？


請使用本手冊幫助您了解有關Monoferric治療的更多資訊，以及如何識別和管理可能的副作用。

甚麼是缺鐵性貧血（IDA）？

IDA是由體內鐵含量低引起的疾病。

鐵在人體各種功能中起著關鍵作用，包括血紅蛋白的產生，血紅蛋白是紅細胞中的一種分子，可將氧氣輸送到整個身體。

如果鐵量不足，那麼您的身體將產生越來越少和較細小的紅細胞，並且血紅蛋白也將減少，從而導致向組織輸送的氧氣不足。



造成IDA的原因是甚麼？

造成IDA的原因很多，包括：

- 失血
- 吸收鐵有問題
- 與炎症相關的多種機制
- 飲食中缺乏鐵
- 鐵需求增加

Monoferric用於不能耐受口服鐵劑（口服）或口服鐵劑治療無效的患者。



IDA的體徵和症狀

IDA的體徵可能包括：

- 皮膚蒼白或發黃
- 指甲脆弱
- 脫髮
- 腿部有不適或不舒服的感覺，以及有移動雙腿的不可抗拒的衝動（不寧腿綜合症）
- 舌酸痛或光滑
- 口腔側面有裂紋



IDA的症狀可能包括：

- 無法解釋的疲勞或精力不足
- 呼吸急促或胸痛，尤其是活動時
- 無法解釋的全身無力
- 心跳加速
- 耳鳴
- 頭痛，尤其是活動時
- 手腳感覺冷
- 注意力難以集中
- 頭暈
- 異常渴望冰或粘土等非食物物品（醫學術語：異食癖）




請記住，您可能沒有注意到IDA的任何體徵和症狀。您的醫生在開Monoferic處方之前會進行血液檢查以確定您的鐵需求，並將進行其他測試，例如測量體重以確定給您多少Monoferic。

甚麼是Monoferric，它如何起作用？

Monoferric是一種暗褐色、不透明的無菌溶液，含有鐵結合分子，可用於提高不能耐受或對口服鐵療法無反應的成年患者的鐵含量。

Monoferric用於向您的身體輸送鐵，並補充身體的鐵儲備。Monoferric被輸送到人體後，鐵在體內被肝臟和脾臟中的細胞吸收並緩慢釋放。鐵是製造血紅蛋白所必需的元素，而血紅蛋白是紅細胞能夠在體內攜帶氧氣所必不可少的。



我使用Monoferric之前，醫生應該了解哪些情況？

在您使用Monoferric之前，請先諮詢醫生，如果您：

- 有藥物過敏史
- 患有狼瘡（一種免疫系統疾病，人體自身的防禦系統攻擊正常組織）
- 患有類風濕關節炎（關節腫脹）
- 患有嚴重的哮喘、濕疹（瘙癢，皮膚發紅）或其他過敏
- 血壓低（低血壓）
- 感染嚴重
- 年齡超過65歲
- 正在服用其他藥物，包括任何藥物、維生素、礦物質、天然補充劑或替代藥物（Monoferric會降低口服鐵的作用）



與您的醫生討論您可能遇到的任何健康狀況或問題，包括上面列出的那些問題，將有助於避免副作用並確保正確使用Monoferric。



請勿使用Monoferric，如果：

- 您對此藥物或任何成分過敏
- 您對其他注射類鐵藥物有嚴重過敏史
- 您患有非鐵缺乏症引起的貧血（溶血性貧血）
- 您鐵過多（鐵過載）或身體使用鐵的方式出現問題（血色素沉著，鐵血黃素沉著）
- 您有肝病（肝硬化，肝炎）

Monoferric治療期間我應該期待什麼？

每個人的Monoferric常規劑量各有不同。醫生會根據您的體重、血液中的血紅蛋白含量和您需要的鐵量來計算確切的劑量。體重超過50kg的患者可能會接受固定的Monoferric劑量，為1000mg。

給藥可能僅一次或每週一次，直至病情得到治療。Monoferric的給藥方式包括：

- 透過手臂的靜脈。這種方式也被稱為靜脈輸注或靜脈注射
 - 靜脈輸注將至少需要20-30分鐘
 - 靜脈注射將在2分鐘內完成
- 在血液透析過程中直接注入透析器

Monoferric治療結束後4周內，醫療人員將評估您的情況，查看是否需要更多治療。

在治療期間，醫生或護士會仔細觀察您可能出現的副作用。

注射型鐵劑產品可能會引起嚴重的過敏反應，包括致命的過敏反應或類過敏反應。Monoferric可能導致嚴重的低血壓（血壓偏低）。

將在過敏事件可被立即治療的地方給予Monoferric。在每次Monoferric治療期間以及之後至少30分鐘，將仔細觀察您的過敏反應體徵和症狀，包括監測血壓和脈搏。

如果您在接受Monoferric時出現以下任何過敏反應症狀，請立即尋求醫療幫助，並確保您的醫生或護士停止Monoferric治療：

- 頭暈或頭暈目眩
- 呼吸困難
- 面部、舌頭或喉嚨腫脹
- 噁心或腹痛
- 吞嚥困難
- 低血壓
- 瘙癢、皮疹或蕁麻疹

為確保Monoferic的使用正確，如果你出現有刺激感或注射部位周圍皮膚出現褐色變色，請務必告知醫療保健專業人員，因為他們需要停止給藥。

不正確的Monoferic給藥可能導致注射部位出現洩漏，進而刺激皮膚。此外，該部位和身體其他部位的皮膚顏色可能會變成褐色。這種狀況可能是長期性的。如果您發現任何洩漏，請立即告知醫護人員。他們將停止給藥。



Monoferic治療後我應該期待什麼？

每次進行Monoferic治療後，醫護人員將至少對您進行30分鐘的監測，您的醫生將安排血液檢查以監測您的血紅蛋白水平和鐵儲備。

進行Monoferic治療後，在開車或使用機械之前先給自己一些時間，看看自己的感覺如何。

Monoferric的可能副作用

Monoferric的副作用可能包括：

- 腹痛
- 背痛
- 胸痛
- 便秘
- 腹瀉
- 大便變色
- 頭暈
- 疲倦
- 發燒
- 注射後數小時至數天內可能出現類似流感的病症，通常的症狀包括發燒、肌肉和關節疼痛等
- 潮紅
- 頭痛
- 消化不良
- 關節疼痛
- 肌肉疼痛或痙攣
- 惡心
- 嘔吐
- 皮膚脫落或變色
- 皮膚發癢
- 喉嚨痛
- 咳嗽
- 鼻子和喉嚨發炎
- 手腳腫脹
- 味覺障礙
- 刺痛感

其他您需要知道的警告

- 注射型鐵劑產品可能導致嚴重的副作用，包括：
 - 超敏（過敏）反應，當免疫系統反應過度並對身體造成傷害時，便會出現超敏反應。即使在給予治療且沒有問題之後，也會出現這種反應
 - 感染
- 可能導致血液中磷酸鹽含量偏低（低磷血症）
- 服用Monoferric後，在開車或使用機械之前先給自己一些時間，看看自己的感覺如何
- Monoferric不適宜處於妊娠期或未採取適當避孕措施的育齡女性。若您已經懷孕或正在備孕，及時告知您的醫生。接受Monoferric治療時，您可能出現嚴重的過敏反應，這可能對您未出生的嬰兒造成嚴重傷害。他們可能會出現心率異常緩慢。這通常會持續很短時間。如果您在懷孕期間服用這種藥物，專業醫護人員應仔細監控胎兒。



這些並不是您服用Monoferric時可能會感覺到的所有副作用。
如果您遇到此處未列出的任何副作用，請與您的醫生聯繫。

我應該向醫療保健專業人員報告 哪些嚴重副作用？

如果您遇到以下任何一種不常見的嚴重副作用，請告知您的醫生：

疾病	症狀
過敏反應（超敏反應）	可能危及生命的頭暈、嚴重瘙癢、蕁麻疹、噁心、呼吸困難、皮疹、血壓低
肺炎	肺部感染引起胸痛、咳嗽、發燒和疲勞
尿道感染	小便時有燒灼感，尿液混濁或流血，有強烈氣味
高血壓	頭痛、頭暈、視力模糊、胸痛或呼吸急促
低血壓	站立時昏厥、頭暈或頭昏眼花
紅細胞數量減少（貧血）	頭暈、疲倦無力、精力不足、呼吸急促

我在哪裡可以了解有關 Monoferric的更多資訊？

欲了解有關Monoferric的更多資訊：

- 與您的醫護專業人員相談
- 有關預防措施和不良事件的完整信息，請查閱產品包裝中包含的「患者用藥資訊」傳單。

如果您有此處未列出的麻煩症狀/副作用，或者嚴重到足以干擾您的日常活動，或者您遇到以下任何罕見的副作用，請告知您的醫生：

- 充血性心力衰竭（心臟不能正常泵出血液）：呼吸短促、疲勞和虛弱、腳踝和腿腳腫脹及腳部腫脹、咳嗽、體液瀦留、食欲不振、噁心、心跳加快或不規則、體力下降
- 呼吸困難（氣短或呼吸困難）
- 心肌梗塞（心臟病發作）：肩胛骨之間、胸部、下頷、左臂或上腹部有壓迫感或擠壓痛、氣短、頭暈、疲勞、頭暈目眩、皮膚粘稠、出汗、消化不良、焦慮、感覺眩暈，及可能出現不規則心跳
- 皮疹：皮膚發紅區域，伴有發癢或疼痛
- 發熱（發燒）
- 癲癇（發作或抽搐）
- 敗血症（嚴重感染）
- 暈厥（昏厥）：由於血壓突然下降而暫時失去意識

也可能會出現超敏（過敏）反應，這可能會危及生命。症狀可能包括發燒、關節痛、噁心、嘔吐、胸痛、皮疹、蕁麻疹、臉/唇/舌/喉部腫脹和/或吞嚥/呼吸困難。如果您出現任何以上症狀，請停止服用Monoferic並立即就醫。

備註：



有關其他 **Monoferric** 資訊
和資源，請訪問
www.Monoferric.ca。



使用該號碼進入網站：02477777

Monoferric®是Pharmacosmos Holding A/S, Rørvangsvej 30, DK-4300 Holbæk, Denmark的註冊商標，經Pfizer Canada ULC授權在加拿大使用。

© 2023 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5
® Pfizer Canada ULC, Licensee

PP-MFR-CAN-0176-EN

